



유아용 분유 분말은 멸균처리되지 않았습니다. 올바르게 분유를 타지 않으면 박테리아 감염의 위험이 높습니다. 수유법에 관해 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 법은 담당 의사 및 공중 보건 간호사와 상담하십시오. 중요한 사실이 기재된 조언지 #1을 참조하십시오.



비누와 물로 손과 부엌 카운터를 닦으십시오.

살균시킨 모든 수유 도구 준비 완료 (조언지 #2 참조).



### 물 멸균하기

물을 2분간 끓이십시오. 어떤 종류의 물이 안전한지 조언지 #2를 참조하십시오.


섭씨 70도 이상의 온도의 물로 분유를 조제하십시오 (끓인 물 1리터는 30분 후 섭씨 70도로 식습니다).

건강한 아기의 경우 즉각 분유 수유를 하는 한, 상온으로 식힌 물을 사용할 수 있습니다.



캔 용기에 나와 있는 유통기한을 확인하십시오.


살균된 젖병에 멸균된 물을 필요한 만큼 붓습니다.



캔 용기에 나와 있는 설명에 따라 적절한 수만큼 퍼 넣으십시오.

분말 국자를 캔 안에 넣고 분말로 채웁니다. 분말을 꼭 누르지 마십시오. 멸균된 칼로 여분의 분말을 깎아 내십시오.


멸균된 물에 분말을 추가하십시오.



살균된 집게로 젖꼭지, 캡 및 링을 집어 병에 끼웁니다.



손으로 병을 돌려 조입니다.



분말 덩어리가 사라질때까지 젖병을 흔드십시오.




흐르는 냉수나 찬 물을 받아 냉각하십시오. 재빨리 젖병을 식하십시오. 분유의 온도가 체온이나 실온으로 내려가면 분유를 수유 하십시오.



아기의 수유 징후에 따라 수유하십시오 (조언지 #6 참조).

아기가 남긴 액상 분유는 2시간 후 버리십시오.



매번 수유 시 신선한 병을 준비하고 즉시 수유하는 것이 가장 안전합니다. 따뜻하거나 뜨거운 물로 젖병에 분유를 탄 경우 흐르는 냉수나 찬 물을 받아 냉각하십시오. 젖병을 식힌 후 냉장고에 보관하고 24시간 이내에 사용하십시오.

아기 수유법 및 시기에 대한 정보는 다음을 보십시오.

- 소책자 **유아 조제 분유** 16 ~ 20쪽: 알아야 할 사항.

- **조언지 #6.**

**유아용 조제 분유는 리콜 조치 될 수 있습니다.**

리콜 정보는 캐나다 보건국 웹 사이트

[www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php](http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php) 에서 확인할 수 있습니다.

