

고농축 액상 분유는 올바르게 준비해야만 안전합니다. 수유법에 관해 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 법은 담당 의사 및 공중 보건 간호사와 상담하십시오. 중요한 사실이 기재된 조언지 #1을 참조하십시오.




비누와 물로 손과 부엌 카운터를 닦으십시오. 살균시킨 모든 수유 도구 준비 완료 (조언지 #2 참조).



뜨거운 물과 비누로 캔 또는 플라스틱 분유 용기의 윗 부분을 세척하십시오. 캔 용기의 나와 있는 유통기한을 확인하십시오. 캔을 잘 흔든 후 살균된 병뚜개로 여십시오.




분유에 쓸 물을 살균하는 법은 조언지 #2를 참조하십시오. 용기 라벨을 읽고 1회 수유에 사용할 분말과 물의 양을 확인하십시오. 실온으로 식힌 멸균수를 살균된 젖병에 부어 양을 측정하십시오.



1회 수유에 필요한 동일한 양의 분유를 측정하십시오.



살균된 젖병에 동일한 양의 분유를 넣으십시오.



살균된 집게로 젖꼭지, 젖병 뚜껑 및 링을 집습니다.



손으로 병을 돌려 조입니다. 손으로 젖꼭지 부분을 만지지 않도록 유의하세요.




병을 부드럽게 흔들어 섞습니다.



아기의 수유 징후에 따라 수유하십시오 (조언지 #6 참조).

아기가 먹다 남긴 액상 분유는 2시간 후 버리십시오.



매번 수유 시 신선한 병을 준비하고 즉시 수유하는 것이 가장 안전합니다. 따뜻하거나 뜨거운 물로 젖병에 분유를 탄 경우 흐르는 냉수 또는 받아둔 냉수에 냉각하십시오. 식힌 젖병을 냉장고에 보관하고 24시간 이내에 사용하십시오.

액상 분유 캔의 개봉 부위를 덮은 후 즉시 냉장 보관하며 냉장고에 최대 48시간 동안 보관 가능합니다.

아기 수유법 및 시기에 대한 정보는 다음을 보십시오.

- 소책자 유아 조제 분유 16 ~ 20쪽: 알아야 할 사항.
- 조언지 #6.

유아용 조제 분유는 리콜 조치 될 수 있습니다. 리콜 정보는 캐나다 보건국 웹 사이트 www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php 에서 확인할 수 있습니다.

